

ПОКАЗАТЕЛЬ № 14: РАСЧЕТ

Реквизиты	Название / Значение	Примечание
Наименование	Частота расхождения краев операционной раны	
Механизм расчета	Число случаев расхождения краев операционной раны *1000 /число выбывших пациентов, которым проведены оперативные вмешательства	
Исходные данные для расчета показателя		<ol style="list-style-type: none"> 1. Число случаев расхождения краев операционной раны 2. Число выбывших (выписанных, умерших) пациентов, которым проведены оперативные вмешательства
Периодичность заполнения	ежеквартально, ежегодно	
Единица измерения	положительное число, два знака после запятой	Отображение показателя на 1000 выбывших пациентов, которым проведены оперативные вмешательства
Нижняя граница	0	Для защиты от неверного введения
Верхняя граница	101	

ПОКАЗАТЕЛЬ № 14: ОПИСАНИЕ

Расхождение краев операционной раны приводит к увеличению длительности госпитализации и стоимости лечения. Причины расхождения краев операционной раны могут быть связаны как с возникновением инфекционных осложнений, так и возникать без признаков инфекции (например, при разрыве шовной нити, развязывании/соскальзывание узлов, прорезывании тканей лигатурой).

Расхождение краев операционной раны – спонтанное расхождение послеоперационных швов.

Критерии включения:

Случаи расхождения краев операционной раны в период госпитализации.

Расхождение краев раны может быть как по всей длине, так и в одном или нескольких определенных местах. Расхождение краев раны может происходить как с выходом наружу подлежащих тканей и органов (включая эвентрацию), так и без него (в том числе с сохранением кожного шва).

Для расчета показателя необходимо проводить подсчет в отделениях и в целом по медицинской организации:

1) количества случаев расхождения краев операционной раны за определенный период времени и **2) общего количества выбывших пациентов (выписанные, умершие), которым проводились оперативные вмешательства** за определенный период времени.

В расчет показателя *не включаются*:

- случаи лечения, когда расхождение краев послеоперационной раны является основной причиной поступления в медицинскую организацию
- случаи расхождения краев послеоперационной раны, установленные до поступления в медицинскую организацию (например, при переводе)
- случаи, когда лечение расхождения краев послеоперационной раны являлось единственным оперативным вмешательством
- случаи лечения, когда для заживления рану оставляют открытой в послеоперационном периоде (например, при высоком риске возникновения инфекции)
- случаи оказания медицинской помощи с длительностью пребывания в организации менее 2 суток