

ПОКАЗАТЕЛЬ № 10: РАСЧЕТ

Реквизиты	Название / Значение	Примечание
Наименование	Частота тромбоза глубоких вен/ТЭЛА в периоперационном периоде	
Механизм расчета	Число случаев тромбоза глубоких вен и (или) ТЭЛА*1000/ число выбывших пациентов, которым проведены оперативные вмешательства	
Исходные данные для расчета показателя		<ol style="list-style-type: none"> 1. Число случаев тромбоза глубоких вен в периоперационном периоде 2. Число случаев ТЭЛА в периоперационном периоде 3. Число выбывших (выписанных, умерших) пациентов, которым проведены оперативные вмешательства
Периодичность заполнения	ежеквартально ежегодно	
Единица измерения	положительное число, два знака после запятой	Отображение показателя на 1000 выбывших пациентов, которым проведены оперативные вмешательства
Нижняя граница	0	Для защиты от неверного введения
Верхняя граница	101	

ПОКАЗАТЕЛЬ № 10: ОПИСАНИЕ

Тромбоз глубоких вен или тромбоэмболия лёгочных артерий (ТЭЛА) являются одними из наиболее распространенных предотвратимых состояний при госпитализации и создают серьезные риски для здоровья пациентов (10-15% случаев с клиническими проявлениями приводят к летальному исходу).

Тромбоз глубоких вен – наличие тромба в глубокой вене, который может вызвать ее окклюзию.

Тромбоэмболия легочных артерий (легочная эмболия, легочная тромбоэмболия) – попадание в легочные артерии эмбола, источником которого являются вены большого круга кровообращения.

Критерии включения:

Случаи возникновения проксимального тромбоза глубоких вен/ТЭЛА во время оперативного вмешательства и/или после него в период госпитализации.

Для расчета показателя необходимо проводить подсчет в отделениях и в целом по медицинской организации: 1) количества случаев проксимального тромбоза глубоких вен и (или) ТЭЛА в периоперационном периоде за определенный период времени и 2) общего количества выбывших пациентов (выписанные, умершие), которым проводились оперативные вмешательства за определенный период времени.

В расчет показателя не включаются:

- случаи лечения, когда проксимальный тромбоз глубоких вен/ТЭЛА является основной причиной поступления в медицинскую организацию
- случаи проксимального тромбоза глубоких вен/ТЭЛА, установленные до поступления в медицинскую организацию (например, при переводе)
- случаи лечения, когда оперативному вмешательству предшествовала тромбэктомия из полой вены, легочных артерий или артерио-венозной фистулы
- случаи лечения, когда тромбэктомия из полой вены, легочных артерий или артерио-венозной фистулы являлась единственным оперативным вмешательством
- лечение, сопровождающееся проведением экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО)
- наличие острой черепно-мозговой и/или позвоночно-спинномозговой травмы при поступлении